


CRIANÇAS e Covid-19





Crianças contraem Covid-19? Quem são os mais vulneráveis?

As crianças contraem Covid-19 e, aquelas com menos de dois anos ou com doenças pulmonares crônicas (asma não controlada e fibrose cística), doenças cardíacas, diabetes ou insuficiência renal, têm risco maior de desenvolver quadros graves.

Crianças realizam testes?





Sim. Após três dias de sintomas, o exame deve ser realizado. De preferência, o RT-PCR.

Quais são os sintomas?

- Febre
- Tosse
- Dor de garganta
- Congestão nasal
- Mal-estar e dor muscular
- Diarréia e náuseas
- Vômitos
- Dor de cabeça

Em casos moderados, a criança tem dificuldades respiratórias. Já em quadros graves, pode apresentar incapacidade de mamar ou ingerir líquidos, letargia*, convulsões ou inconsciência. Também há relatos de problemas dermatológicos, como manchas vermelhas na pele, lábios secos ou rachados e roxidão nos dedos.

*Um estado de cansaço e sonolência profunda, que envolve diminuição da energia, da capacidade mental e da motivação.








As medidas de proteção contra a Covid-19 são as mesmas para as crianças?

Crianças com menos de dois anos não devem usar máscara. Há risco de causar sufocamento porque nesta idade ainda não são capazes de remover o acessório sem assistência. Garanta que o calendário vacinal do pequeno esteja em dia, principalmente em relação às vacinas contra gripe e pneumonia.



E quanto às medidas de higiene?

É importante ensiná-las a lavar as mãos e usar máscara. O isolamento social também deve ser seguido, já que as crianças podem transmitir a Covid-19 para outras pessoas com maior risco, como pais ou avós.



Como saber quando levar a criança ao médico?

- Em caso de febre alta (superior a 39 °C) que não ceda com antitérmico
- Febre persistente por mais de 5 dias
- Perda de olfato ou paladar
- Dificuldade para respirar (sinal de alerta para gravidade)
- Coloração azulada ou arroxeadada da pele ou extremidades
- Dificuldade em ingerir líquidos e se alimentar
- Alteração de comportamento
- Dor abdominal ou dor no peito intensa e vômitos persistentes
- Crianças menores de 3 meses, com febre superior a 38 °C



SAÚDE



GOV
RJ